

Nome e Cognome \_\_\_\_\_

N. di matricola \_\_\_\_\_

1a- Un composto di X costituito da O(68.84%), O(26.20%) e H(4.95%). La formula minima del composto è:

- C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O<sub>2</sub>
- C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O
- C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O
- C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O<sub>2</sub>
- 

1b- Per il composto C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>X, il valore % dell'elemento X è uguale a 50.89. Il composto è:

- C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>F
  - C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>Cl
  - C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>Br
  - C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>I
  - C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>At
- \*\*\*\*\*

2a- Secondo il principio di esclusione di Pauli, un orbitale può contenere al massimo:

- Due elettroni purché di spin parallelo
- Due elettroni purché di spin opposto
- Un elettrone di spin +1/2
- Un elettrone di spin -1/2
- Nessuna delle risposte sopra elencate

2b- Il potere riduttore degli elementi è: riga (da sinistra verso destra) è:

- Maggiore per gli elementi metallici
  - Maggiore per gli elementi semi-metallici
  - Maggiore per gli elementi non metallici
  - Cresce al crescere dell'elettronegatività
  - Nessuna delle delle risposte sopra elencate
- \*\*\*\*\*

3a- Si intende temporaneare una soluzione a pH 1. Quale sistema temporaneo occorre impiegare?

(acido acetico, pKa=4.75; ione solfito monocidico, pKa=1.92; acido nitroso, pKa=3.35; acido fluoridrico, pKa=3.14);

- acido acetico/acettato di sodio
- solfito monocidico di sodio/solfito di sodio
- acido fluoridrico/fluoruro di sodio
- acido nitroso/nitrito di sodio
- 

3b- La solubilità dell'idrossido ferroso a pH=7 è pari a 0.794. Il K<sub>sp</sub> dell'idrossido è:

- 7.94 10<sup>-1</sup>
  - 7.94 10<sup>-15</sup>
  - 1.59 10<sup>-14</sup>
  - 1.59 10<sup>-4</sup>
  -
- \*\*\*\*\*

4a- Solfito monocidico di alluminio, permanganato di sodio, pirofosfato biacido di potassio. Quale risposta corrisponde a questa sequenza:

- Al(HSO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>, Na<sub>2</sub>MnO<sub>4</sub>, KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>
- Al(HSO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>, Na<sub>2</sub>MnO<sub>4</sub>, K<sub>2</sub>H<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>
- Al(HSO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>, Na<sub>2</sub>MnO<sub>4</sub>, K<sub>2</sub>H<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>
- Al(HSO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>, Na<sub>2</sub>MnO<sub>4</sub>, K<sub>2</sub>H<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>
- 

4b- Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, Cr<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>8</sub>. La corretta nomenclatura di questi composti è:

- nitrito piomboso, solfito di Cr(II) e acido tiosolfatico
  - nitrito piomboso, solfito di Cr(II) e acido tiosolfatico
  - nitrito piomboso, solfito di Cr(II) e acido tiosolfatico
  - nitrito piomboso, solfito di Cr(II) e acido dissolfatico
  - nitrito piomboso, solfito di Cr(II) e acido tiosolfatico
- \*\*\*\*\*


5a- Per una soluzione 1.8% di NaCl (PM=58.44) la frazione molare del solvente è (PM H<sub>2</sub>O=18):

- 0.105
- 0.005
- 0.895
- 0.995
- 

5b- Mescolando 120 ml di HCl 0.1 M a 240 ml 0.05M di NaOH, la molarità della soluzione di sale ottenuta è:


- 0.100M
  - 0.033M
  - 0.050M
  - 0.333M
  -
- \*\*\*\*\*

6a- Dopo aver bilanciato la reazione, calcolare quanti gr di acido iodidico si ottengono partendo da 100 gr di acido arancioso, sapendo che la reazione ha una rea al 20%:




- 81.2
- 10.3
- 31.2
- 40.6
- 

6b- Dopo aver bilanciato la reazione, calcolare quanti gr di cloruro stannico si ottengono partendo da 100 gr di permanganato, sapendo che la reazione ha una rea al 100%:




7a- Il seguente equilibrio, a 800 °C,



la pressione dell'anidride è pari a 0.236 atm. Pertanto si deducono le seguenti K<sub>p</sub> e K<sub>a</sub> alla stessa temperatura:

- K<sub>p</sub>=2.00 e K<sub>a</sub>=2.68
- K<sub>p</sub>=2.00 e K<sub>a</sub>=2.00
- K<sub>p</sub>=0.260 e K<sub>a</sub>=2.68
- K<sub>p</sub>=0.236 e K<sub>a</sub>=0.236
- 

7b- Se si considera la reazione di formazione dell'ammoniaca da H<sub>2</sub> e N<sub>2</sub>, si possono scrivere le tre equazioni di equilibrio:



per le quali:

Si ricava la stessa costante di equilibrio essendo la reazione la stessa

$$0 \quad K_{(\text{p})} = \sqrt{K_{(\text{a})}}; \quad K_{(\text{a})} = \sqrt{K_{(\text{p})}}$$

0  $K_{(\text{p})} = K_{(\text{a})} = K_{(\text{c})}$  perché T sia costante

$$0 \quad K_{(\text{p})} = 2K_{(\text{a})} = 3K_{(\text{c})}$$

\*\*\*\*\*

8a- Una soluzione acquosa di idrossido di ammonio (a 25 °C K<sub>a</sub> = 1.8·10<sup>-5</sup> a 25 °C) ha titolo incognito viene salificata completamente con HCl. Il pH finale della soluzione è 5.2. Assumendo trascurabile il volume dell'HCl, la concentrazione dell'idrossido era:

0 7.17

0 0.0717

0 0.00717

0 0.717

0

8b- Per l'acido H<sub>4</sub>A è corretto affermare che:

- H<sub>4</sub>A è un acido, HA<sup>3-</sup> è una base e A<sup>4-</sup> è un anfolita
- H<sub>4</sub>A è un anfolita, H<sub>3</sub>A<sup>2-</sup> è un anfolita e HA<sup>3-</sup> è un anfolitin
- H<sub>4</sub>A è un acido, H<sub>3</sub>A<sup>2-</sup> è un anfolita e Ha<sup>4-</sup> è una base
- H<sub>4</sub>A è un acido, H<sub>3</sub>A<sup>2-</sup> è un base e H<sub>2</sub>A<sup>3-</sup> è un anfolita
- 

9a- Formula di struttura del bisolfuro ferroico

9b- Formula di struttura del clorito di rame(I)

1 - Una soluzione acquosa di idrossido di ammonio (a 25 °C K<sub>a</sub> = 1.8·10<sup>-5</sup> a 25 °C) ha titolo incognito viene salificata completamente con HCl. Il pH finale della soluzione è 5.2. Assumendo trascurabile il volume dell'HCl, la concentrazione dell'idrossido era:

0 7.17

0 0.0717

0 0.00717

0 0.717

0

2 - Detti i seguenti acidi, con le relative costanti acide in acqua a 25 °C: HA, pKa = 2; NH<sub>4</sub><sup>+</sup>, pKa = 9.29; MeOH, pKa = 15.2; HOXO<sub>2</sub>, pKa = 1.4; H<sub>2</sub>S, pKa = 7; indicare la risposta che riporta le specie nell'ordine corretto di acidità DCRESCENTE (dal più acido al meno acido):

- HOXO<sub>2</sub>, HA, H<sub>2</sub>S, NH<sub>4</sub><sup>+</sup>, MeOH
- MeOH, NH<sub>4</sub><sup>+</sup>, H<sub>2</sub>S, HA, HOXO<sub>2</sub>
- MeOH, NH<sub>4</sub><sup>+</sup>, H<sub>2</sub>S, HA, HOXO<sub>2</sub>
- H<sub>2</sub>S, NH<sub>4</sub><sup>+</sup>, MeOH, HA, HOXO<sub>2</sub>
- 

3 - La solubilità dell'idrossido ferroico (K<sub>sp</sub>=1.0·10<sup>-36</sup>) a pH 4:

0 10<sup>-4</sup>

0 10<sup>-1</sup>

0 10<sup>-6</sup>

0 10<sup>-4</sup>

0

4 - Sapendo che per l'acido fosforico pKa<sub>1</sub>=2.15, pKa<sub>2</sub>=7.21 e pKa<sub>3</sub>=12.36, il pH di una soluzione 0.1 M di fosfato di sodio vale:

0 6.18

0 3.60

0 12.68

0 4.68

0

5 - All'equilibrio per la reazione A<sub>2</sub>=2A la frazione molare di A<sub>(a)</sub> vale 0.4 alla pressione di 2.5 atm. La K<sub>p</sub> della reazione è:

0 1.2·10<sup>3</sup>

0 0.6667

0 5.3444

0 0.1333

0

6 - La temperatura di ebollizione e di congelamento di una soluzione ottenuta sciogliendo in un litro di acqua 125 gr di cloruro di potassio (K<sub>b</sub>=0.512 e K<sub>cry</sub>=1.86) è:

0 96.23 °C e 6.23 °C

0 93.77 °C e +1.72 °C

0 101.72 °C e -6.23 °C

0 106.23 °C e -1.72 °C

0

7 - Indicare l'ordine corretto, in senso decrescente, dell'elettronegatività dei seguenti elementi:

0 N,C,Be,Li

0 Be,Li,C,N

0 Li,C,Be,N

0 N,Li,Na,Be

0

8 - Per gli elementi del 1° gruppo dal blocco sp, quale delle seguenti affermazioni è errata:

0 Sono elementi con stati di ossidazione solo positivi

0 In natura si trovano solo nei loro composti

0 In natura si possono trovare anche come singoli elementi (non insieme ad altri elementi a formare composti)

0 Sono buoni conduttori di elettricità e calore

0

Porzione di esempio di un compito. Le domande da '1a e 1b' a '9a e 9b' sono su argomenti minimi irrinunciabili indicati nel programma con \*.  
Bisogna rispondere correttamente ad almeno una per ogni coppia per superare la prova.  
Vi sono altre 12 Domande (da 1 a 12) per raggiungere il voto finale




## IDROGENO $1s^1$

L'idrogeno è in assoluto l'elemento più abbondante dell'universo. Esso è molto diffuso anche sulla terra essendo presente principalmente come acqua ( $H_2O$ ) e inoltre nella quasi totalità dei composti organici.

allo stato elementare è un gas costituito da molecole biatomiche, ma come gas è assai raro in natura; si trova solo in piccole quantità nelle emanazioni vulcaniche e nei gas naturali.

Esistono due suoi isotopi, il deuterio,  $_1^2D$ , e il trizio,  $_1^3T$ .


I metodi di preparazione in laboratorio comportano l'impiego di sostanze riducenti capaci di far ottenere l'idrogeno per riduzione dell'acqua. Le principali reazioni sfruttate sono:



Industrialmente si può ottenere al catodo per elettrolisi dell'acqua.

Reazione catodica:  $2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$ .

Si può anche ottenere facendo passare vapor d'acqua su carbone a 1000° C (gas d'acqua):



# Chimica

*Scienza che studia:*

*proprietà, composizione e struttura della materia,  
e  
le trasformazioni che in essa avvengono*

# Materia

Liquida, solida o gassosa:  
Qualsiasi cosa che occupi uno spazio e possieda una massa

## Eterogenea

Composizione non uniforme

Separazione Fisica

## Omogenea

Composizione uniforme

## Sostanza Pura

Composizione costante

Separazione Fisica

## Soluzioni o Miscele

# La Chimica è una scienza sperimentale:

Si basa su misure ottenute da esperimenti fatti in condizioni prestabiliti e dall'interpretazione dei dati ottenuti dal sistema analizzato.


**Sistema** = quantità percettibile di materia su cui si possa effettuare un'osservazione macroscopica.

La materia nelle sue trasformazioni cede o acquista energia

*L'energia* è l'attitudine di un sistema a compiere *Lavoro (L)*

$$L = \bar{F} \cdot \bar{l}$$


Forza per Spostamento



# Proprietà della *materia*

**Proprietà Fisiche:** *possono essere specificate senza riferimento ad altre sostanze. Es. gas, liquido, solido, temperatura di ebollizione, ecc.*

**Proprietà Chimiche:** *sono specificate rispetto ad altre sostanze. Es. il ferro con ossigeno da ossido di ferro*



*mentre in acido cloridrico si sviluppa idrogeno*



Le **proprietà macroscopiche** si distinguono in:

**Estensive**, dipendono dalla quantità di materia che forma il sistema

(*Volume, Massa, Calore sviluppato, ecc*)

**Intensive**, non dipendono dalla quantità di materia

(*Temperatura, Pressione, Densità, Viscosità, ecc*)

Grandezza	Unità	Simbolo
lunghezza	metro	m
massa	chilogrammo	kg
tempo	secondo	s
corrente elettrica	ampere	A
temperatura	kelvin	K
intensità luminosa	candela	cd
quantità di sostanza	mole	mol
angolo piano	radiante	rad
angolo solido	steradiante	sr

Multiplo	Prefisso	Simbolo	Sottomultiplo	Prefisso	Simbolo
$10^{12}$	tera	T	$10^{-1}$	deci	d
$10^9$	giga	G	$10^{-2}$	centi	c
$10^6$	mega	M	$10^{-3}$	milli	m
$10^3$	chilo	k	$10^{-6}$	micro	$\mu$
$10^2$	etto	h	$10^{-9}$	nano	n
$10^1$	deca	da	$10^{-12}$	pico	p
			$10^{-15}$	femto	f
			$10^{-18}$	atto	a

Notazione Scientifica dei numeri in base 10:

$$125 = 1.25 \cdot 10^2$$

$$0.432 = 4.32 \cdot 10^{-1}$$

Grandezza	Unità	Abbreviazione
area	metro quadrato	$\text{m}^2$
volume	metro cubo	$\text{m}^3$
velocità	metro per secondo	$\text{m s}^{-1}$
accelerazione	metro per secondo quadrato	$\text{m s}^{-2}$
densità	chilogrammo per metro cubo	$\text{kg m}^{-3}$
massa molare	chilogrammo per mole	$\text{kg mol}^{-1}$
volume molare	metro cubo per mole	$\text{m}^3 \text{ mol}^{-1}$
concentrazione molare	mole per metro cubo	$\text{mol m}^{-3}$

Grandezza	Unità	Simbolo	In unità SI
frequenza	hertz	Hz	$\text{s}^{-1}$
forza	newton	N	$\text{kg m s}^{-2}$
pressione	pascal	Pa	$\text{N m}^{-2} = \text{kg m}^{-1} \text{ s}^{-2}$
energia, lavoro, calore	joule	J	$\text{N m} = \text{kg m}^2 \text{ s}^{-2}$
potenza	watt	W	$\text{J s}^{-1}$
carica elettrica, quantità di elettricità	coulomb	C	A s
potenziale elettrico, differenza di potenziale elettrico, forza elettromotrice	volt	V	$\text{J A}^{-1} \text{ s}^{-1} = \text{kg m}^2 \text{ s}^{-3} \text{ A}^{-1}$
resistenza elettrica	ohm	$\Omega$	$\text{V A}^{-1} = \text{kg m}^2 \text{ s}^{-3} \text{ A}^{-2}$

Grandezza	Unità	Simbolo	In unità SI
lunghezza	Ångstrom	Å	$1 \cdot 10^{-10}$ m
volume	litro	l	
forza	dina	din	$1 \cdot 10^{-5}$ N
energia	erg	erg	$1 \cdot 10^{-7}$ J
energia	elettronvolt	eV	$1,602189 \cdot 10^{-19}$ J
energia	caloria	cal	4,184 J
pressione	atmosfera	atm	101325 Pa
pressione	millimetri di mercurio	mmHg	133,322 Pa
pressione	torr	torr	133,322 Pa
massa	unità di massa atomica nella scala unificata	u	$1,66054 \cdot 10^{-27}$ kg
temperatura	grado centigrado °C (o Celsius)	°C	K – 273,15

# Classificazione della Materia

## Elementi, Composti e Miscele

- Gli **elementi** sono le più semplici sostanze che si possono ottenere attraverso processi chimici.  
  
Sono più di 100 di cui 90 naturali  
Per distinguerli sono assegnati nomi e simboli. es. azoto, N.
- I **composti** sono sostanze formate da due o più **elementi**.  
  
Per distinguerli sono assegnati formule chimiche e nomi (IUPAC)  
es. NaCl cloruro di sodio
- Le **miscele** sono miscugli di due o più **elementi** e/o due o più **composti**.  
  
Le **miscele** si distinguono in **miscele omogenee** ed **eterogenee**

Elemento	Simbolo	Nome latino
Sodio	Na	<i>Natrium</i>
Potassio	K	<i>Kalium</i>
Ferro	Fe	<i>Ferrum</i>
Rame	Cu	<i>Cuprum</i>
Argento	Ag	<i>Argentum</i>
Oro	Au	<i>Aurum</i>
Mercurio	Hg	<i>Hydrargyrum</i>
Antimonio	Sb	<i>Stibium</i>
Stagno	Sn	<i>Stannum</i>
Piombo	Pb	<i>Plumbum</i>

Elemento	Simbolo	Elemento	Simbolo	Elemento	Simbolo
Afnio	Hf	Cromo	Cr	Lutezio	Lu
Alluminio	Al	Curio	Cm	Meitnerio**	Mt
Americio	Am	Disprosio	Dy	Neo	Ne
Antimonio	Sb	Dubnio**	Db	Neodimio	Nd
Argento	Ag	Elio	He	Nettunio	Np
Argo	Ar	Einstenio	Es	Nichel	Ni
Arsenico	As	Erbio	Er	Niobio	Nb
Astato	At	Europio	Eu	Nobelio	No
Attinio	Ac	Fermio	Fm	Olmio	Ho
Azoto	N	Ferro	Fe	Oro	Au
Bario	Ba	Fluoro	F	Osmio	Os
Berillio	Be	Fosforo	P	Ossigeno	O
Berkelio	Bk	Francio	Fr	Palladio	Pd
Bismuto	Bi	Gadolinio	Gd	Piombo	Pb
Bohrio**	Bh	Gallio	Ga	Platino	Pt
Boro	B	Germanio	Ge	Plutonio	Pu
Bromo	B	Hassio**	Hs	Polonio	Po
Cadmio	Cd	Idrogeno	H	Potassio	K
Calcio	Ca	Indio	In	Praseodimio	Pr
Californio	Cf	Iodio	I	Promezio	Pm
Carbonio	C	Iridio	Ir	Protoattinio	Pa
Cerio	Ce	Itterbio	Yb	Radio	Ra
Cesio	Cs	Ittrio	Y	Rado (Radon)	Rn
Cloro	Cl	Lantanio	La	Rame	Cu
Cobalto	Co	Laurenzio	Lr	Renio	Re
Cripto	Kr	Litio	Li	Rodio	Rh

(\*) Noto anche come Wolframio

(\*\*) Nuovi elementi

# Materia

Liquida, solida o gassosa:  
Qualsiasi cosa che occupi uno spazio e possieda una massa

## Eterogenea

Composizione non uniforme

Separazione Fisica

## Omogenea

Composizione uniforme

## Sostanza Pura

Composizione costante

Separazione Fisica

## Soluzioni o Miscele

## Composti



Elementi combinati in rapporti definiti

Separazione Chimica

Trasformazione Chimica

## Elementi

Non divisibili mediante trasformazioni chimiche



# Leggi della combinazione chimica

Una **legge** è una generalizzazione basata sui risultati di molte osservazioni sperimentali

## Legge della Conservazione della Massa (Lavoisier):

*Nelle reazioni chimiche non si osservano apprezzabili variazioni (perdita o acquisto) di massa.*

## Legge delle Proporzioni definite (Proust):

*In un dato composto, gli elementi sono sempre combinati nello stesso rapporto di massa.*

## Legge delle Proporzioni Multiple:

*Quando due elementi formano più composti, le diverse masse di uno che si combinano con la medesima massa dell'altro sono in un rapporto di numeri interi piccoli.*

## Legge delle Proporzioni definite (Proust):

In un dato composto, gli elementi sono sempre combinati nello stesso rapporto di massa.

Indipendentemente da come un *composto* viene ottenuto, reazione oppure estrazione, il rapporto di massa tra i vari *elementi* che lo compongono è costante.


es.

18 gr di acqua contiene 2.00 gr di H e 16.00 gr di O

1 kg di acqua contiene 111.11 gr di H e 888.89 gr di O

$$\frac{m(H)}{m(O)} = \frac{2}{16} = \frac{111.11}{888.89} = \frac{1}{8}$$

**Pirite di ferro,**  
**minerale naturale formato da S (zolfo) e Fe (ferro)**



1 gr di pirite contiene 0.4655 gr di Fe e 0.5345 gr di S

$$\frac{m(S)}{m(Fe)} = \frac{0.5345 \text{ gr } S}{0.4655 \text{ gr } Fe} = 1.148 \frac{S}{Fe}$$

La **legge delle proporzioni definite** permette di dare una definizione completa, anche se non definitiva, di composto:

*Un composto chimico è una sostanza costituita da due o più elementi combinati sempre in un rapporto di masse definite*

Questa definizione non è definitiva perché possono esistere composti diversi che hanno lo stesso numero di elementi con lo stesso rapporto di massa.

Es. **cicloesano** e **metilcilopentano** sono costituiti con gli stessi elementi H e C e con lo stesso rapporto di massa (1 gr di H per 6 gr di C)

**Legge delle Proporzioni Multiple:** Quando due elementi formano più composti, le diverse masse di uno che si combinano con la medesima massa dell'altro sono in un rapporto di numeri intei piccoli.

Es.

Pirite (FeS2)      **1** gr di Fe per **1.148** gr di S

Triolite (FeS)      **1** gr di Fe per **0.574** gr di S

$$\frac{1.148 \text{ gr } S}{0.574 \text{ gr } S} = 2$$

Acqua (H2O)


**16** gr di O per **2.0** gr di H

Acqua Ossigenata (H2O2)

**16** gr di O per **1.0** gr di H

$$\frac{2.0 \text{ gr } H}{1.0 \text{ gr } H} = 2$$

# TEORIA ATOMICA DI DALTON



## Limiti

**1. Gli atomi sono costituiti da partecipanti subatomiche;**

**2. La massa di uno stesso elemento varia da isotopo ad isotopo**

Il primo ricercatore a proporre il concetto di atomo (dal greco = invisibile) è stato **John Dalton** (1803) il quale enunciò le seguenti ipotesi fondamentali:

### Teoria atomica della materia

- a) La materia è costituita da particelle indivisibili chiamate atomi;
- b) Gli atomi sono caratterizzati dalla loro massa; atomi di uno stesso elemento hanno la stessa massa e le stesse proprietà; elementi diversi sono costituiti da atomi con proprietà diverse e quindi con masse diverse;
- c) I composti sono formati dalla combinazione chimica di atomi di differenti elementi in un rapporto di numeri interi e piccoli;
- d) Nel corso di una reazione chimica gli atomi non si creano e non si distruggono mantenendo la loro individualità.

## Principio di Avogadro

Volumi uguali di gas diversi, nelle stesse condizioni di temperatura e di pressione, contengono lo stesso numero di molecole

$$d_A = \frac{w_A}{V}$$

$$d_{rel} = \frac{d_A}{d_B} = \frac{\frac{w_A}{V}}{\frac{w_B}{V}} = \frac{w_A}{w_B} = \frac{M_A}{M_B}$$


## Regola di Cannizzaro

Il peso atomico di un elemento è dato dalla più piccola quantità in peso con cui l'elemento si trova nei pesi molecolari dei suoi vari composti

Sostanza	Peso molecolare	Contributo di ossigeno a una quantità in peso uguale al peso molecolare
Ossigeno, O <sub>2</sub>	32	32
Ossido di azoto, NO	30	16
Acqua, H <sub>2</sub> O	18	16
Acqua ossigenata, H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	34	32
Ossido di carbonio, CO	28	16
Diossido di carbonio, CO <sub>2</sub>	44	32
Diossido di zolfo, SO <sub>2</sub>	64	32
Triossido di zolfo, SO <sub>3</sub>	80	48

# Equazioni Chimiche


Una "reazione chimica" è una trasformazione della materia in cui alcune sostanze (*reagenti*) si trasformano in altre (*prodotti*). Questo processo viene formalmente rappresentato da un'equazione



"→" = reagisce per dare

Per Dalton la legge della conservazione della massa

- viene riformulata come - legge di conservazione degli atomi



**Stechiometria:** branca della chimica che si occupa della determinazione delle quantità delle sostanze che partecipano alle *reazioni chimiche*

# Costituzione degli atomi

	Carica (C)	Carica (e)	Massa (kg)
Protone	+ $1,6022 \cdot 10^{-19}$	+ 1	$1,673 \cdot 10^{-27}$
Neutrone	0	0	$1,675 \cdot 10^{-27}$
Elettrone	- $1,6022 \cdot 10^{-19}$	- 1	$9,1094 \cdot 10^{-31}$

La carica è una proprietà fisica della materia:

Ne esistono due tipi positiva (+) e negativa (-);



Due cariche di segno opposto (+ e -) si attraggono;

Due cariche di segno uguale (+ e + opp - e -) si respingono.

La forza con cui due cariche ( $q_1$  e  $q_2$ ) interagiscono segue la *legge di Coulomb*

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_\alpha q_\beta}{r_{\alpha\beta}^2}$$

# Esperimento di Rutherford



## Modello di Rutherford:

L'atomo ha gli elettroni che orbitano intorno al nucleo (costituito da protoni e neutroni)

L'atomo di un elemento è caratterizzato dal numero di protoni posseduti, chiamato **numero atomico (Z)**

**Z = numero atomico = numero di protoni**


**N = numero di neutroni**

**A = numero di massa**


$$A = Z + N \rightarrow N = A - Z$$

Le proprietà chimiche di un elemento dipendono dal numero di protoni (Z).

Gli **isotopi** sono atomi di uno stesso elemento che differiscono per il numero di massa (A).




# Vengono indicati con il simbolo




Vengono denominati con:  
(Elemento-numero di massa)  
es. Carbonio-12



Nucleo  
di idrogeno




Nucleo  
di deuterio




Nucleo  
di trizio

Isotopi Ossigeno




# Spettrometro di massa



La quantità con cui gli isotopi sono presenti nella miscela isotopica vengono espresse con *l'abbondanza percentuale o relativa*

	Isotipi Ossigeno		
	$^{16}_8O$	$^{17}_8O$	$^{18}_8O$
<i>Percentuale</i>	99.762	0.038	0.200
<i>relativa</i>	0.99762	0.00038	0.00200



Il protone ed il neutrone hanno una massa dell'ordine di  $1.6 \cdot 10^{-27}$  kg.

Quindi un atomo ha una massa compresa tra  $10^{-27} - 10^{-25}$  kg.

Non è pratico

Si utilizza quindi una scala relativa

La scala attuale dei **pesi atomici (pa)** assume come unità di massa atomica (u) la dodicesima parte dell'isotopo naturale più leggero del carbonio (carbonio-12) ponendo così la massa di questo isotopo uguale a 12.000 *u*.

$$\frac{\text{peso atomico}}{\text{massa atomica relativa}} = \frac{\text{massa dell'atomo considerato}}{\text{massa dell'atomo di riferimento}}$$

$$\text{unità di massa atomica (u)} = \frac{1}{12} \text{ della massa dell'isotopo } {}^{12}_6\text{C}$$

$$\text{Peso atomico dell'isotopo } {}^{12}_6\text{C} = 12.000$$

$$\text{Peso atomico del protone} = 1.007276$$

$$\text{Peso atomico del neutrone} = 1.008665$$

$$\text{Peso atomico del elettrone} = 0.000548$$

**Definizione:** Il **peso atomico** corrisponde alla massa relativa media degli atomi di un elemento rispetto alla dodicesima parte degli atomi di C-12, presi come riferimento.

**Peso atomico =  $\Sigma x_i \cdot m_i$**

**$x_i$  = abbondanza relativa del singolo isotopo nella miscela isotopica naturale**  
 **$m_i$  = massa relativa del singolo isotopo**  
 **$\Sigma$  = sommatoria estesa a tutti gli isotopi della miscela**

Elemento	Isotopo	Massa atomica relativa	Abbondanza relativa	Peso atomico
Idrogeno	${}_1^1H$	1,008	0,9998	1,008
	${}_1^2H$	2,014	0,0002	
Ossigeno	${}_8^{16}O$	15,995	0,99762	15,999
	${}_8^{17}O$	16,999	0,00038	
	${}_8^{18}O$	17,999	0,00200	
Carbonio	${}_6^{12}C$	12,000	0,9890	12,011
	${}_6^{13}C$	13,003	0,0111	

1	Idrogeno	H	1,00794	56	Bario	Ba	137,327
2	Elio	He	4,002602	57	Lantanio	La	138,9055
3	Litio	Li	6,941	58	Cerio	Ce	140,1115
4	Berillio	Be	9,012182	59	Praseodimio	Pr	140,90765
5	Boro	B	10,811	60	Neodimio	Nd	144,24
6	Carbonio	C	12,011	61	Promezio-145	Pm	144,9127
7	Azoto	N	14,00674	62	Samario	Sm	150,36
8	Ossigeno	O	15,9994	63	Europio	Eu	151,965
9	Fluoro	F	18,9984032	64	Gadolinio	Gd	157,25
10	Neo	Ne	20,1797	65	Terbio	Tb	158,92534
11	Sodio	Na	22,989768	66	Disprosio	Dy	162,50
12	Magnesio	Mg	24,3050	67	Olmio	Ho	164,93032
13	Alluminio	Al	26,981539	68	Erbio	Er	167,26
14	Silicio	Si	28,0855	69	Tullio	Tm	168,93421
15	Fosforo	P	30,973762	70	Itterbio	Yb	173,04
16	Zolfo	S	32,066	71	Lutezio	Lu	174,967
17	Cloro	Cl	35,4527	72	Afnio	Hf	178,49
18	Argo	Ar	39,948	73	Tantallo	Ta	180,9479
19	Potassio	K	39,0983	74	Wolframio	W	183,84
20	Calcio	Ca	40,078	75	Renio	Re	186,207
21	Scandio	Sc	44,955910	76	Osmio	Os	190,23
22	Titanio	Ti	47,867	77	Iridio	Ir	192,217
23	Vanadio	V	50,9415	78	Platino	Pt	195,08
24	Cromo	Cr	51,9961	79	Oro	Au	196,96654
25	Manganese	Mn	54,93805	80	Mercurio	Hg	200,59
26	Ferro	Fe	55,845	81	Tallio	Tl	204,3833
27	Cobalto	Co	58,93320	82	Piombo	Pb	207,2

28	Nichelio	Ni	58,6934	83	Bismuto	Bi	208,98037
29	Rame	Cu	63,546	84	Polonio	Po	(209)
30	Zinco	Zn	65,39	85	Astato	At	(210)
31	Gallio	Ga	69,723	86	Rado	Rn	(222)
32	Germanio	Ge	72,61	87	Francio	Fr	(223)
33	Arsenico	As	74,92159	88	Radio-226	Ra	226,0254
34	Selenio	Se	78,96	89	Attinio	Ac	(227)
35	Bromo	Br	79,904	90	Torio	Th	232,0381
36	Cripto	Kr	83,80	91	Protoattinio	Pa	231,03588
37	Rubidio	Rb	85,4678	92	Uranio	U	238,0289
38	Stronzio	Sr	87,62	93	Nettunio	Np	237,0482
39	Ittrio	Y	88,90585	94	Plutonio-244	Pu	244,0642
40	Zirconio	Zr	91,224	95	Americio-243	Am	243,0614
41	Niobio	Nb	92,90638	96	Curio-247	Cm	247,0703
42	Molibdeno	Mo	95,94	97	Berkelio-247	Bk	247,0703
43	Tecnezio-99	Tc	98,9063	98	Californio-251	Cf	251,0796
44	Rutenio	Ru	101,07	99	Einsteinio	Es	(254)
45	Rodio	Rh	102,90550	100	Fermio	Fm	(257)
46	Palladio	Pd	106,42	101	Mendelevio	Md	(258)
47	Argento	Ag	107,8682	102	Nobelio	No	(259)
48	Cadmio	Cd	112,411	103	Laurenzio	Lr	(260)
49	Indio	In	114,818	104	Rutherfordio	Rf	(261)
50	Stagno	Sn	118,710	105	Dubnio	Db	(262)
51	Antimonio	Sb	121,757	106	Seaborgio	Sg	(266)
52	Tellurio	Te	127,60	107	Bohrio	Bh	(262)
53	Iodio	I	126,90447	108	Hassio	Hs	(265)
54	Xeno	Xe	131,29	109	Meitnerio	Mt	(266)
55	Cesio	Cs	132,90543				

**I composti sono caratterizzati da una formula chimica:**

Es. acqua,  $H_2O$ ; metano,  $CH_4$ ; ammoniaca,  $NH_3$ ; cloruro di sodio,  $NaCl$ .

Si introduce quindi un *peso molecolare* ( $pm$ ) dato dalla somma di tutti gli atomi costituenti la molecola.

$$pm = \sum pa(El_i)$$

Es.

nel caso dell'acqua ( $H_2O$ )

$$\begin{aligned} pm(H_2O) &= pa(H) + pa(H) + pa(O) \\ &= 1.008 + 1.008 + 15.999 \\ &= 18.015 \end{aligned}$$

Quando il composto non è costituito da molecole ma da un insieme infinito, come ad esempio i sali, si parla di *peso formula* ( $pf$ ) che è dato dalla somma dei pesi di tutti gli atomi compresi nella formula chimica.

$$\begin{aligned} pf(NaCl) &= pa(Na) + pa(Cl) \\ &= 22.990 + 35.543 = 58.523 \end{aligned}$$

**Mole:** *Quantità di sostanza che contiene tante particelle (atomi, molecole, ioni, elettroni, fotoni, etc) quanti sono gli atomi ( $N_A$ ) contenuti in 12.000 gr di  $^{12}_6C$*

$$N_A = \text{Numero di Avogrado} = 6.0221367 \cdot 10^{23}$$

**oppure**

**Mole:** *una quantità di sostanza che contiene un numero di Avogadro,  $N_A$  di particelle.*

Per **massa molare** si intende la massa di una mole delle particelle considerate – **esempio la massa molare del carbonio-12 = 12 gr.**

Elemento	Peso atomico	Massa molare (g/mol)	Composto	Peso molecolare	Massa molare (g/mol)
Idrogeno (H)	1,008	1,008	H <sub>2</sub> O	18,016	18,016
Oro (Au)	196,97	196,97	CO <sub>2</sub>	44,01	44,01
Zinco (Zn)	65,39	65,39	Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	105,99	105,99

Dalla massa  $m$  (g) di una sostanza di massa molare  $M$  (g/mol) si ricava il numero  $n$  di moli:

$$\frac{m \text{ (g)}}{M \text{ (g/mol)}} = n \text{ (mol)}$$

1,008 g di idrogeno = 1 mol di atomi H = 0,5 mol di molecole H<sub>2</sub>

2,016 g di idrogeno = 1 mol di molecole H<sub>2</sub> = 2 mol di atomi H

9,008 g di acqua = 0,5 mol di molecole di acqua

# Esercizi

Concetto di mole e numero di Avogadro

Quanti atomi di carbonio “C” sono contenuti in 6.00 gr di questo elemento?

$$pa(C) = \mathbf{12.011}$$

$$n(mol) = \frac{m(g)}{M(g/mol)} = \frac{6.00(g)}{12.011(g/mol)} = 0.500(mol)$$

$$1 \text{ mol di } C = N_A \text{ atomi di } C = 6.0221367 \cdot 10^{23} \text{ atomi di } C$$

$$0.5 \text{ mol di } C = 0.5 \cdot N_A \text{ atomi di } C = \\ 3.01 \cdot 10^{23} \text{ atomi di } C$$

# Esercizi

Concetto di mole e numero di Avogadro

Quante molecole di  $H_2O$  sono contenute in 250 g di acqua?

$$pa(O) = 16.0 \ ; pa(H) = 1.008$$

$$\begin{aligned} pm(H_2O) &= 2pa(H) + pa(O) \\ &= 2 \cdot 1.008 + 16.0 = 18.015 \end{aligned}$$

$$n(mol) = \frac{m(g)}{M(g/mol)} = \frac{250(g)}{18.0(g/mol)} = 13.9(mol)$$

1 mol di  $H_2O = N_A$  molecole di  $H_2O =$

$$6.0221367 \cdot 10^{23} \text{ molecole di } H_2O$$

13.9 mol di  $H_2O = 13.9 \cdot N_A$  molecole di  $H_2O =$

$$8.37 \cdot 10^{24} \text{ molecole di } H_2O$$

## Esercizi

**Quante moli di zolfo(S) si devono combinare con 2.00 mol di ferro (Fe) per formare pirite di ferro (FeS<sub>2</sub>)**

FeS<sub>2</sub> → 1 *mol* Fe si combina con 2 *mol* S

$$\frac{2 \text{ mol S}}{1 \text{ mol Fe}} = \frac{X \text{ mol S}}{2 \text{ mol Fe}}$$

$$X \text{ mol S} = 2 \cancel{\text{ mol Fe}} \cdot \frac{2 \text{ mol S}}{1 \cancel{\text{ mol Fe}}} = 4 \text{ mol S}$$

## Esercizi

Il metano ha formula chimica  $\text{CH}_4$ . Se un campione di metano contiene 0.30 mol di atomi di C, quante mol di H sono contenute



$$\frac{4 \text{ mol H}}{1 \text{ mol C}} = \frac{X \text{ mol H}}{0.30 \text{ mol C}}$$

$$X \text{ mol H} = 0.3 \cancel{\text{ mol C}} \frac{4 \text{ mol H}}{1 \cancel{\text{ mol C}}} = 1.20 \text{ mol H}$$

## Esercizi

Quante moli di ferro si combinano con 0.220 moli di atomi di ossigeno per dare  $\text{Fe}_2\text{O}_3$




$$\frac{\text{2 mol Fe}}{\text{3 mol O}} = \frac{\text{X mol Fe}}{\text{0.22 mol O}}$$

$$\text{X mol Fe} = 0.22 \cancel{\text{mol O}} \quad \frac{\text{2 mol Fe}}{\cancel{3 \text{ mol O}}} = 0.147 \text{ mol Fe}$$

## Esercizi

L'ossigeno allo stato elementare si trova come molecola bi-atomica ( $O_2$ ). Quante *mol* di Fe e di  $O_2$  sono necessari per formare 0.500 mol di  $Fe_2O_3$



1.3 mol  $Fe_2$  formano 1 mol  $Fe_2O_3$

$$X_{Fe} = 1.00 \text{ mol Fe}$$

$$X_{O_2} = 0.75 \text{ mol } O_2$$

$$\frac{2.5 \text{ mol } FeO_2}{1 \text{ mol } Fe_2O_3} = \frac{X \text{ mol } Fe_2}{0.5 \text{ mol } Fe_2O_3}$$

$$X \text{ mol } Fe_2 = 0.5 \text{ mol } Fe_2O_3 \quad \frac{2.5 \text{ mol } FeO_2}{1 \text{ mol } Fe_2O_3} = 0.05 \text{ mol } Fe_2O_2$$

# Esercizi

Determinare la massa (*m*) di 0.586 *mol* di arseniato di calcio,  $\text{Ca}_3(\text{AsO}_4)_2$ .

$$\text{pa(Ca)} = 40.1$$

$$\text{pa(As)} = 74.9$$

$$\text{pa(O)} = 16.0$$

$$\begin{aligned}pf(\text{Ca}_3(\text{AsO}_4)_2) &= 3\text{pa(Ca)} + 2\text{pa(As)} + 8\text{pa(O)} \\&= 398.11 + 2 \cdot 74.9 + 8 \cdot 16.0 \\&= 398.1\end{aligned}$$

Massa molare di  $\text{Ca}_3(\text{AsO}_4)_2 = 398.18 \text{ g/mol}$

$$n(\text{mol}) = \frac{m(\text{g})}{M(\text{g/mol})} \quad \longrightarrow$$

$$\begin{aligned}m(\text{g}) &= n(\text{mol}) \cdot M(\text{g/mol}) \\&= 0.586 \cdot 398.1\end{aligned}$$

$$m(\text{g}) = 233.2866 \text{ g di } \text{Ca}_3(\text{AsO}_4)_2$$

$$m(\text{g}) \sim 233 \text{ g di } \text{Ca}_3(\text{AsO}_4)_2$$

## Esercizi

Determinare la massa ( $m$ ) di 0.586 mol di ciascuna delle seguenti sostanze:

- a) acqua, H<sub>2</sub>O;
- b) glucosio, C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub>;
- c) metano CH<sub>4</sub>;
- d) ferro, Fe.

	<i>pa</i>		<i>pm</i>
H	1.01	H <sub>2</sub> O	18.0
C	12.0	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>6</sub>	180.0
O	16.0	CH <sub>4</sub>	16.0
Fe	55.8		

<i>Massa molare</i>	<i>M(g/mol)</i>
H <sub>2</sub> O	18.0
C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>6</sub>	180.0
CH <sub>4</sub>	16.0
Fe	55.8

$$n(\text{mol}) = \frac{m(\text{g})}{M(\text{g/mol})}$$

$$m(\text{g}) = n(\text{mol}) \cdot M(\text{g/mol})$$

$$M(\text{g/mol}) \cdot n(\text{mol}) = m(\text{g})$$

$$\text{H}_2\text{O} \quad 18.0 \cdot 0.586 = 10.5$$

$$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \quad 180.0 \cdot 0.586 = 105$$

$$\text{CH}_4 \quad 16.0 \cdot 0.586 = 9.38$$

$$\text{Fe} \quad 55.8 \cdot 0.586 = 32.7$$

## Esercizi

Determinare quante **moli** di **bicarbonato di sodio** ( $\text{NaHCO}_3$ ) sono presenti in **21 g** di questo composto.

$$\text{pa(Na)} = 23.0$$

$$\text{pa(H)} = 1.08$$

$$\text{pa(C)} = 12.0$$

$$\text{pa(O)} = 16.0$$

$$\begin{aligned}pf(\text{NaHCO}_3) &= \text{pa(Na)} + \text{pa(H)} + \text{pa(C)} + 3\text{pa(O)} \\&= 23.0 \quad + 1.08 \quad + 12.0 \quad + 3 \cdot 16.0 \\&= 84.0\end{aligned}$$

$$n(\text{mol}) = \frac{m(\text{g})}{M(\text{g/mol})}$$

$$n(\text{mol}) = \frac{21 \text{ g}}{84.0 \frac{\text{g}}{\text{mol}}} = 0.250 \text{ mol}$$

## Esercizi

Determinare il numero di **moli** presenti in 100 g di ciascuno dei seguenti composti.

- a) ammoniaca, NH<sub>3</sub>;
- b) Alcol etilico, C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O;
- c) Oro, Au.

	pa
H	1.01
C	12.0
N	14.0
O	16.0
Au	197

	pm
NH <sub>3</sub>	17.0
C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O	46.0

$$n(mol) = \frac{m(g)}{M(g/mol)}$$

	$m(g) / M(g/mol) = n(mol)$
NH <sub>3</sub>	100 / 17.0 = 5.88
C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O	100 / 46.1 = 2.17
Au	100 / 197 = 0.508

# Determinazione della **Formula Chimica** di una sostanza

## **Analisi Qualitativa** –

Permette di identificare gli **elementi** che compongono la sostanza

## **Analisi Quantitativa** –

Permette di determinare la **massa** di ciascun *elemento* contenuto nel campione della sostanza.

I risultati di un'analisi quantitativa vengono riportati sotto forma di **percentuale in peso**

**La percentuale in peso di un elemento in un composto corrisponde alla massa (in g) dell'elemento presente in 100 g di composto.**

Un elenco di queste percentuali viene chiamato **composizione percentuale**.

## Esercizi

Un campione di un liquido di peso **8.657 g** viene scisso negli elementi ottenendo:

- i) **5.217 g** di carbonio;
- ii) **0.962 g** di idrogeno;
- iii) **2.478 g** di ossigeno.

Determinare la percentuale in peso di ciascuno di questi elementi nel liquido.

$$5.217 + 0.962 + 2.478 = 8.657$$

$$\frac{\%(\text{El}) \text{ g}}{100 \text{ g di composto}} = \frac{m(\text{El}) \text{ g}}{m_T \text{ g di composto}}$$

$$\%(\text{C}) \text{ g} = \frac{5.217(\text{C}) \text{ g}}{8.657 \text{ g di composto}} \cdot 100 \text{ g di composto} = 60.26 \%$$

$$\%(\text{H}) \text{ g} = \frac{0.962}{8.657} \cdot 100 = 11.11 \%$$

$$\%(\text{O}) \text{ g} = \frac{2.478}{8.657} \cdot 100 = 28.62 \%$$

60.26 +  
11.11 +  
28.62 =  
99.99

Calcolare la composizione percentuale di un solido sconosciuto per cui un'analisi quantitativa su  $0.4620\text{ g}$  ha dato i seguenti risultati:

- i)  $0.1945\text{ g}$  di C;
- ii)  $0.02977\text{ g}$  di H;
- iii)  $0.2377\text{ g}$  di O.

$$\begin{array}{r} 0.1945 \text{ g di C} + \\ 0.02977 \text{ g di H} + \\ 0.2377 \text{ g di O} = \\ \hline 0.46197 \text{ g massa totale (m}_t\text{)} \end{array}$$

$\approx 0.4620\text{ g}$

**quattro cifre significative**

$$\% (el) = \frac{m (el)}{m_t} \cdot 100$$

$$\% (C) = \frac{0.1945 (C)}{0.4620} \cdot 100 = 42.10\%$$

$$\% (H) = \frac{0.02977 (H)}{0.4620} \cdot 100 = 6.44\%$$

$$\begin{array}{r} \% (O) = \frac{0.2377 (O)}{0.4620} \cdot 100 = 51.45\% \\ \hline 99.99\% \end{array}$$

Determinare la percentuale in peso di ciascun elemento dell'ossido di calcio (CaO).

$$pa(\text{Ca}) = 40.08 \quad pf = pa(\text{Ca}) + pa(\text{O}) = 40.08 + 16.00 = 56.08$$
$$pa(\text{O}) = 16.00$$

In 56.08 g di CaO ci sono 40.08 g di Ca e 16.00 g di O

$$\% (\text{El}) = \frac{m (\text{el})}{m_t} \cdot 100$$

$$\% (\text{Ca}) = \frac{40.08 \text{ (Ca)}}{56.08} \cdot 100 = 71.47 \%$$

$$\% (\text{O}) = \frac{16.00 \text{ (O)}}{56.08} \cdot 100 = 28.53 \%$$
$$100.00 \%$$

# Formula Minima (o Empirica)

è la formula (chimica) di un composto che usa quali indici i più bassi numeri interi possibili

es.	formula minima	formula chimica
Benzene	CH	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>

## Esempio

Da una analisi quantitativa su un campione di un composto sconosciuto, di massa 2.571 g, risultano 1.102 g di C e 1.469 g di O. Determinare la formula minima.

$$pa(C) = 12.01$$

$$pa(O) = 16.00$$

mol

$$C \ 0.09176$$

$$O \ 0.09181$$

Convertire le masse in moli  
Quindi scriviamo la formula

$$n(mol) = \frac{m(g)}{M(g/mol)}$$

$$n_C(mol) = \frac{C}{M_C(g/mol)} = \frac{0.09176}{12.01} = 0.09176 \text{ mol}$$

monossido di carbonio

$$n_O(mol) = \frac{O}{M_O(g/mol)} = \frac{1.469}{16.00} = 0.09181 \text{ mol}$$

Che dobbiamo trasformare in interi  
dividiamo quindi gli indici per il più piccolo

*Se gli indici calcolati differiscono per poche unità nell'ultima cifra decimale si possono arrotondare ad un intero.*

Determinare la formula minima (o empirica) di un composto per il quale l'analisi su un campione, di massa 2.448 g, ha trovato che contiene:

- i) 2.000 g di C;
- ii) 0.4477 g di H

*Convertire le masse in moli*

$$pa(H) = 1.008$$

$$pa(C) = 12.01$$

$$n_H = 0.4441 \text{ mol}$$

$$n_C = 0.1665 \text{ mol}$$

$$n(\text{mol}) = \frac{m(g)}{M(g/mol)}$$

$$\begin{array}{c} \text{C} \\ \frac{0.0005}{0.1665} \\ \text{H} \\ \frac{0.0001}{0.1665} \end{array} \times 3$$

**La formula Empirica del composto è**

$$n_C(\text{mol}) = \frac{\frac{m_C(g)}{M_C(g/mol)}}{\frac{2.000 \text{ g}}{12.01 \text{ g/mol}}} = 0.1665 \text{ mol}$$

C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>

(propano)

Determinare la formula minima (o empirica) del carbonato di bario, che ha la seguente composizione percentuale:

- i) Ba 69.58 %;
- ii) C 6.090 %;
- iii) O 24.32 %

Quindi in 100 g di composto abbiamo

69.58 g di Ba;

6.090 g di C;

24.32 g di O

$$pa(\text{Ba}) = 137.3$$

$$pa(\text{C}) = 12.01$$

$$pa(\text{O}) = 16.00$$

$$n(\text{mol}) = \frac{m(g)}{M(g/mol)}$$

Convertire le masse in moli

Formula empirica del carbonato di bario


$$n_{\text{Ba}}(\text{mol}) = \frac{m_{\text{Ba}}(g)}{M_{\text{Ba}}(g/mol)} = \frac{69.58 \text{ g}}{137.3 \text{ g/mol}} = 0.5068 \text{ mol di Ba}$$



$$n_{\text{C}}(\text{mol}) = \frac{\frac{69.58}{0.5068} \times 0.5071}{M_{\text{C}}(g/mol)} \frac{6.090}{12.01 \text{ g/mol}} = 0.5071 \text{ mol di C}$$

$$n_{\text{O}}(\text{mol}) = \frac{m_{\text{O}}(g)}{M_{\text{O}}(g/mol)} = \frac{24.32 \text{ g}}{16.00 \text{ g/mol}} = 1.520 \text{ mol di O}$$

	formula minima		formula chimica
Benzene	CH	× 6	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>
Perossido di idrogeno	HO	× 2	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>



**Determinare la formula molecolare (o chimica) dello stirene, che ha formula empirica CH, e peso molecolare 104.**

Formula minima



$$pa(\text{H}) = 1.00$$

$$pa(\text{C}) = 12.0$$

$\times n$

Formula molecolare



$$pf(\text{CH}) = pa(\text{H}) + pa(\text{C}) =$$

$$1.00 + 12.0 = 13.0$$

**Formula molecolare dello stirene**



$$pm(\text{C}_n\text{H}_n) = n \cdot pa(\text{H}) + n \cdot pa(\text{C}) = n \cdot (pa(\text{H}) + pa(\text{C}))$$

$$pm(\text{C}_n\text{H}_n) = n \cdot pf(\text{CH})$$

$$n = \frac{pm(\text{C}_n\text{H}_n)}{pf(\text{CH})} = \frac{104}{13} = 8$$

L'idrazina ha peso molecolare **32.1** e contiene **87.42 %** di azoto (N) e **12.58 %** di idrogeno (H). Determinare la formula chimica (molecolare)

Quindi in **100 g** di composto abbiamo

**87.42 g** di N;

**12.58 g** di H

$$pa(H) = 1.008$$

$$pa(N) = 14.01$$

Formula minima  $\text{NH}_2$  Convertire le masse in moli

$$n(mol) = \frac{m(g)}{M(g/mol)}$$

$$mf(\text{NH}_2) = \frac{m_{\text{N}}(g)}{2 \cdot pa(\text{H})} = \frac{87.42}{2 \cdot 1.008} = 44.21 \text{ mol di N}$$

*Formula empirica dell'idrazina*

$$pm(\text{N}_n\text{H}_{n \times 2}) = \frac{m_{\text{H}}(g) \cdot 2.40}{M_{\text{H}}(g/mol)} = \frac{12.58}{1.008} = n \cdot 12.43 \text{ mol di H(N)}$$

*Formula molecolare dell'idrazina*

$$pm(\text{N}_n\text{H}_{n \times 2}) = n \cdot pf(\text{NH}_2)$$

$$\text{N}_2\text{H}_4$$

$$n = \frac{pm(\text{N}_n\text{H}_{n \times 2})}{pf(\text{NH}_2)} = \frac{32.1}{16.03} = 2.002$$

